Berry Blood Fresh

Herbal product

Information on the use of this product.
Please read carefully:

Compositions:

Each Capsule contains:

Blueberry fruits Extract 250 mg.
The excipients: Magnesium Stearate.

Properties of blueberry:

Bilberry is stated to possess astringent, tonic, antioxidant and antiseptic properties. Several activities, such as ophthalmic, wound healing, Antiskin ulcers, anti-atherosclerotic, and vasoprotective activities have been documented for Blueberry. Anthocyanins have also been reported to inhibit platelet aggregation. The hypolipidemic and hypoglycemic activity of oral administration of dried hydroalcoholic extract of the leaf has been demonstrated in animal studies

Extract of blueberry have demonstrated antibacterial activity against several species including Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

Compounds in Blueberry called pro-anthocyanins have been found to promote urinary tract health Blueberry extracts have powerful antioxidant activity.

Antioxidant Effects:

Blueberry (Vacciniummyrtillus) extract exhibited potent antioxidant activity Protect from the development of many of diseases.

Proanthocyanidin are components of Blueberry that support the urinary tract health and decrease inflammation risk by preventing bacteria from adhering to the cells that underlay the urinary tract walls.

Uses:

Anti-oxidant because of its content (Anthocyanins, phenolic compounds and Flavonids).

Drug Interactions:

Anticoagulants, and Antiplatelet and Thrombolytic Agents, low molecular weight Heparins: Increased risk of bleeding with concomitant use, Clinical Management: Monitor the patient closely for signs and symptoms of bleeding .Adjust the







anticoagulant dose only if patient is consistently taking Bilberry with a consistent and standardized product.

Precautions and adverse reactions:

Side effects may include those relating to the skin, gastrointestinal, and nervous systems.

High doses and prolonged use of blueberry may lead to chronic intoxications. Digestive complaints including nausea due to the high tannin content.

Contrauses:

Pregnancy: Not to be used during pregnancy.

Breastfeeding: Not to be used while breastfeeding.

Side effects:

No health hazards or side effects are known in conjunction with the proper administration of designated therapeutic dosages.

Consult your doctor if you have certain illnesses or health conditions before taking any supplements. Hypersensitivity reactions or drug interactions may occur, and if they occur, stop using the product and consult your doctor.

Storage:

Should be kept in tightly closed containers, in a dry place and away from light.

Dosage:

1-2 capsules, 2 times in the morning and bedtime.

KEEP THIS AND ALL MEDICINES OUT OF CHILDREN'S REACH!



UGARIT PHARMACEUTICAL Co. (Fanari & Partners) - Aleppo, Syria Under license of Sonsan Co., Korea





بيري بلد فريش ستصريبي

معلومات عن استخدام المستحضر. يرجى القراءة بعناية :

التركيب:

تحتوى كل محفظة على:

مادة فعالة: خلاصة ثمار توت العليق ٢٥٠ ملغ السواغات: شمعات المغنزيوم

خصائص توت العليق:

بمتلك توت العليق خو اصاً قابضة، مقوية، مضادة أكسدة ومطهرة. كما تم توثيق عدد من الفعاليات مثل شكفاء الجروح، مضاد تقرحات جلدية، مضاد للتصلب العصيدي وحام للأوعية الدموية

كما تبين أن أنتوسيانين تثبط تجمع الصفيحات. وقد أظهرت الدر اسات على الحسيو انات أن الامتصاص الفموي للخلاصات المائية/الكحولية المجففة لأوراق توت العليق تتمتع بخواص خافضة لسكر الدم وشحوم

فعالية مضادة للجراثيم ضد عدد من السللات مثل: المكورات العنقودية الذهبية والأشريشية القولونية. وجدت مركبات في توت العليق تدعى طليعة الانثو سيانين تعزز من صحة القناة البولية.

تملك خلاصات توت العليق فعالية قوية مضادة للأكسدة تحدمن تطور عدد من الأمراض.

الإستخدام:

مضاد أكسدة نظراً لاحتوائه على أنتوسيانينات، المركبات الفينولية والفلافونيدات

التداخلات الدوائية:

إن مضادات التخثر، مضادات تجمع الصفيحات، العوامل الحالة للخثرة، الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي: كلها تزيد خطر النزف لدى مشاركتها مع (توت العليق).

راقب المريض جيداً من أجل علامات أعراض النزف. اضبط جرعة مضاد التخثر إذا كان المريض يأخذ بشكل مستمر توت العليق.

التحذيرات والتفاعلات العكوسة:

قد تتعلق التأثيرات الجانبية بالجلد، جهاز الهضم و الجهاز







قد يؤدي الاستخدام الطويل و بجر عات عالية إلى تسمم مز من تتضمن الشكاوي الهضمية الغثيان بسبب المحتوى العالى من العفص.

مضادات الاستعمال:

يجب عدم استخدامه خلال الحمل و الإرضاع.

التأثيرات الجانبية:

لا تأثير ات جانبية لدى تناو له بالمقادير العلاجية المناسبة. استشر الطبيب في حال كنت تعانى من أمراض أو حالات صحية معينة قبل تناول أي متمم.

قد بحدث تفاعلات تحسسية او تداخلات دو ائية غير مدرجة بالنشرة وفي حال حدوثها توقف عن استخدام المستحضر واستشر طبيبك.

حفظ المستحضر:

يحفظ في عبوات محكمة الإغلاق، في مكان بارد ويحمى من الضوء.

الجرعة اليومية:

من محفظة إلى محفظتين، صباحاً ومساءً.







