

# Haemo B12 Capsules

## Food supplement

Information on the use of this product.  
Please read carefully :

### COMPOSITIONS:

Each Capsule contains sustained release pellets of:

#### Active ingredients:

Iron (Fumarate)	24	mg.
Zinc	12	mg.
Copper	2000	mcg.
Folic acid	500	mcg.
Vit.B12	10	mcg.
Vit.B6	5	mg.

#### Properties :

Iron is an essential mineral , which is required for the formation of hemoglobin This carries oxygen to tissue where it is used for the release of energy from food. As well as keeping blood healthy, iron is required to help maintain resistance to infection and intellectual performance.

But sometimes our diets are not well balanced and everyday activities, such as drinking tea or coffee, can inhibit iron absorption.

**HAEMO-B12** Capsules provide an effective source of vital blood forming nutrients including organic iron, folic acid and vitamin B12.

**HAEMO-B12** slow release system ensures that the release of blood forming nutrients is gradual and even.

#### Uses:

- prophylaxis of anemia including iron deficiency.
- Pre and post - operative.
- Nutrient deficiency.
- Prophylaxis of anemia during pregnancy and lactation.
- Compensation of blood loss during, hemorrhage and any blood loss.
- Assistance in case of hair-loss including iron deficiency.

#### Contrauses:

Hypersensitivity to any component of the product.

#### Drug interaction:

The absorption of iron salts (**Haemo B12**) and Tetracycline is diminished when they are taken concomitantly by mouth ,if treatment with both Tetracyclin and **Haemo B12** is required , the iron salt (**Haemo B12**) should be administered 2 hours before or 3 hours after the tetracycline.

Some anti acids may also decrease the absorption of iron salts (**Haemo B12**).

The response to iron (**Haemo B12**) may be delayed in patient receiving concomitant Chloramphenicol therapy.

#### Precautions:

**HAEMO-B12** should be taken on a full stomach.

Preferably take the capsule with a full glass of water or a cold drink. Do not exceed the recommended dose.

The use of food supplements is not substituted for healthy eating and balanced food.

Food supplements may have drug interactions that are not known or not listed in the leaflet.

Consult your doctor or pharmacist before use.

#### Side Effects:

Not known.

#### Dosage:

One Capsule daily or as prescribed by the doctor.

#### STORAGE:

Store at a temperature below 25°C, away from light and moisture.



#### Packing:

30 Capsules.

60 Capsules.

 **KEEP THIS AND ALL PRODUCTS OUT OF CHILDREN'S REACH!**



  /Ugaritpharma  
[www.ugaritpharma.com](http://www.ugaritpharma.com)

Ugarit Pharmaceutical Co , Aleppo - syria



معلومات عن استخدام المستحضر. يرجى القراءة بعناية :

### التركيب:

تحتوي كل محفظة على حثيرات ذات تحرر مديد من:

### المواد الفعالة:

حديد (فومارات الحديدية)	٢٤	ملغ
زنك	١٢	ملغ
نحاس	٢٠٠٠	مكغ
حمض الفوليك	٥٠٠	مكغ
فيتامين ب ١٢	١٠	مكغ
فيتامين ب ٦	٥	ملغ

### الخصائص:

يعتبر الحديد معدنًا أساسيًا، مطلوبًا لتشكيل خضاب الدم الذي يحمل الأكسجين للنسج حيث يستخدم لتحرير الطاقة من الطعام كذلك للحفاظ على صحة الدم، يحتاج الجسم للحديد للحفاظ على مقاومة الأحمال والأداء الفكري .

ولكن في بعض الأحيان يكون النظام الغذائي غير متوازن وتنبط العادات اليومية مثل شرب القهوة والشاي من امتصاص الحديد .

تؤمن محافظ **هيمو ب ١٢** مصدرًا فعالاً للمواد المغذية الحيوية المكونة للدم بما فيها الحديد العضوي، حمض الفوليك وفيتامين B12.

تضمن محافظ **هيمو ب ١٢** ذات التحرر البطيء أن تحرر المغذيات المكونة للدم يتم بشكل تدريجي ومتساو.

### الاستعمال:

- الوقاية من فقر الدم المتضمن عوز الحديد .

- قبل وبعد العمل الجراحي .

- العوز الغذائي.

- الوقاية من فقر الدم خلال فترة الحمل والإرضاع .

- تعويض فقد الدم خلال فترة الحيض ، النزيف ، أي خسارة للدم .

- المساعدة في حالات فقدان الشعر الناتج عن نقص الحديد .

### موانع الاستعمال:

فرط الحساسية لأي مكون من المستحضر .

### التداخلات الدوائية:

تؤدي المصاحبة الدوائية مع التيترا سيكلين الى الحد من امتصاص أملاح الحديد في **هيمو ب ١٢** في حال ضرورة العلاج

بالتيترا سيكلين و **هيمو ب ١٢** .

يجب تناول **هيمو ب ١٢** قبل تناول التيترا سيكلين بساعتين او بعده بثلاث ساعات .

تؤثر مضادات الحموضة على امتصاص أملاح الحديد وتحد منه وكذلك تعمل أملاح الحديد على تقليل التأثير العلاجي للنبسلايين . استخدام **هيمو ب ١٢** مع الكلورامفينيكول تؤدي إلى تأخير الاستجابة العلاجية لـ **هيمو ب ١٢** (أملاح الحديد).

### التحذيرات:

يجب تناول **هيمو ب ١٢** على معدة ممتلئة . يفضل تناول المحفظة مع كأس من الماء أو شراب بارد. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها . لا يغني استخدام المتممات الغذائية عن تناول الغذاء الصحي المتوازن.

قد يكون للمتممات الغذائية تداخلات دوائية غير معروفة أو غير مدرجة في النشرة .

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل الاستخدام .

### التأثيرات الجانبية:

لم تعرف بعد التأثيرات الجانبية .

### الجرعة:

محفظة واحدة يوميًا أو كما ذكر الطبيب .

### شروط الحفظ:


تحفظ العبوة في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية، بعيداً عن الضوء والرطوبة.

### التعبئة:

٣٠ محفظة في بلستر .

٦٠ محفظة في بلستر .

احفظ هذا المستحضر وجميع المستحضرات الأخرى بعيداً عن متناول الأطفال.



أوغاريت للصناعات الدوائية حلب - سوريا

