



بانقينو

مضغوطات ملبسة بالفيلم

التركيب:

مضغوطات ملبسة بالفيلم :

تحتوي كل مضغوظة ملبسة بالفيلم على:

خلاصة إيفوريبا بروستراتا ١٠٠ ملغ (تحتوي على ٣,١٥ - ٨,٢٥ ملغ من الفلافونيدات الكلية محسوب على شكل apigenin-7-glucooside و ١٢,٦-٤٤,٠٠ ملغ من الفينولات الكلية محسوبة على شكل حمض الغاليك).

السواغات:

النواة : سيلولوز دقيق التبلور ، مانيتول ، كروس كارميلوز الصوديوم ، لاکتوز ، تالك ، ثنائي أوكسيد السيليكون الغرواني.

الفيلم : هيبروميلوز ، ثنائي أوكسيد التيتانيوم ، بولي إيثيلين غليكول ٤٠٠ .

آلية التأثير:

الفلافونويدات وحمض الفينوليك لهما تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للام ومضادة للأكسدة ومضادة للتخثر وواقية للأوعية. من المعروف أن التانينات تمتلك خصائص قابضة وخواص تخثر الدم. أكدت الدراسات قبل السريرية التي أجريت على المستخلص قدرته على التنام الجروح وفعاليتها المضادة للبواسير .

الاستطبابات:

يستخدم في علاج البواسير . يمكن أيضاً استخدامه لتخفيف الأعراض لمرضى البواسير من الدرجة الثالثة والرابعة بعد استئصال البواسير .

مضادات الاستطباب:

- تاريخ من الحساسية تجاه الأيفوريبا أو الفلافونويدات أو أي من المكونات الموجودة في الصيغة
- اضطرابات النزيف

- النساء الحوامل أو المرضعات

التحذيرات والاحتياطات :

الفصول الكبدية والكلى:

- لم يتم تقييم مضغوطات خلاصة Euphorbia prostrata في المرضى الذين لديهم دليل على وجود خلل في وظائف الكبد و / أو الكلى لذلك يجب تجنبه في مثل هؤلاء المرضى .
- له احتمالية تغيير الخصائص التخثرية لذا يجب استخدامه بحذر عند تناوله مع مضادات التخثر والعوامل المضادة لتجمع الصفائح الدموية.

- لم يتم تقييم فعالية وسلامة الخلاصة في المرضى الأطفال لذلك يجب تجنب إعطاءه للأطفال

الحمل و الإرضاع:

لا يعطي للحوامل و الرضعات

التداخلات الدوائية:

لم يتم الإبلاغ عن أي تداخلات دوائية واضحة

التأثيرات الغير مرغوبة لا

عادة ما تكون أقرص خلاصة إيفوريبا بروستراتا جيدة التحمل. التأثيرات الجانبية المبلغ عنها من خفيفة إلى معتدلة في الشدة. لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة أو شديدة حتى الآن. التأثيرات الغير مرغوبة المبلغ عنها هي الغثيان ، عسر الهضم وآلام البطن وآلام المعدة والتهاب المعدة والإسهال والدوخة والصداع والتهاب الجلد التماسي ورد الفعل التحسسي وفرط الحساسية وجفاف الفم. إلى جانب الحدوث العكسي السريري ، فإن اختلال ز من البروثرومبين (غير مرتبط بالأعراض السريرية للنزيف) و كرياتينين المصل تمت ملاحظتها

الجرعة وطريقة الإعطاء:

يستخدم عن طريق الفم فقط.

يمكن تناول المضغوطات مع أو بغض النظر عن الوجبات

الجرعة الموصى بها كما يلي: علاج البواسير: قرص واحد ١٠٠ مجم مرة واحدة يومياً لمدة ١٤ يوماً.

في حالة ما بعد استئصال البواسير في مرضى البواسير من الدرجة ٣ و ٤: قرص واحد ١٠٠ مجم مرتين يومياً لمدة ١٤ يوماً.

فرط الجرعة :

لا يوجد حالات من حدوث فرط جرعة مع استخدام مضغوطات إيفوريبا بروستراتا تم الإبلاغ عنها الى اليوم ولكن في حال حدوث فرط الجرعة يجب أن تؤخذ الرعاية الداعمة العامة في حال فرط الجرعة .

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي 3 بليستر pvc/alu كل بليستر يحتوي ١٠ مضغوطات ملبسة بالفيلم.

شروط الحفظ:

يحفظ المستحضر دون درجة ٢٥ مئوية بعيدا عن الضوء والرطوبة بعيدا عن تناول الأطفال.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات .
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الاوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

(محتاد الصيادلة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)



Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

أوغاريت للصناعات الدوائية حلب - سوريا



PANVENO

Film coated tablets



Composition:

Each Film Coated tablet contains:

Euphorbia prostrata extract 100 mg (Containing 3.15-8.25 mg total flavonoid calculated as apigenin-7-glucoside and 12.6-44.0 mg total phenolics calculated as gallic acid).

Excipients:

Core: Microcrystalline cellulose, Mannitol, Croscarmellose sodium, Lactose, Talc, Colloidal silicon dioxide,

Film: hypromellose, titanium dioxide, PEG 400

Mechanism of action:

Flavonoids and phenolic acid have been reported to have anti-inflammatory, analgesic, antioxidant, haemostatic, antithrombotic and vasoprotective actions. Tannins are known to possess astringent and haemostatic properties. Preclinical studies carried out on the extract have confirmed its wound healing and antihemorrhoidal activity.

Indications:

Euphorbia prostrata extract tablet is indicated for treatment of hemorrhoids. It is also indicated for providing symptomatic relief to patients of grade 3 and 4 hemorrhoids following hemorrhoidectomy.

Contraindications:

- History of hypersensitivity to Euphorbia prostrata extract, flavonoids and/or any constituents of the formulation
- Bleeding disorders
- Pregnant or lactating women

WARNING AND PRECAUTIONS:

Hepatic and renal dysfunction:

Euphorbia prostrata extract tablet has not been evaluated in patients with evidence of hepatic and/or renal dysfunction, Therefore it should be avoided in such patients.

Euphorbia prostrata extract tablet have the potential to alter coagulation profile, thus they should be used with caution when co-administered with anticoagulant, and platelet anti-aggregant agent. Efficacy and safety of Euphorbia prostrata extract tablet has not been evaluated in pediatric patients. The use of Euphorbia prostrata extract tablet should therefore be avoided in pediatric patients.

Pregnancy and lactations:

Not for Pregnant or lactating women

Drug interactions:

No significant drug interactions have been reported with the use of Euphorbia prostrata extract tablet.

Adverse effects:

Euphorbia prostrata extract tablets are generally well tolerated. The reported adverse event are mild to moderate in intensity. No serious or severe adverse event has been reported so far. The reported adverse event are nausea, dyspepsia, abdominal pain, gastralgia, gastritis, diarrhea, dizziness, headache, contact dermatitis, allergic reaction, hypersensitivity and dry mouth. Besides the clinical adverse event, derangement of the prothrombin time (not associated with clinical symptoms of bleeding) and serum creatinine (not considered related to the study medication) have occasionally been reported

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The Euphorbia prostrata extract tablet is recommended for oral administration only. The tablet can be taken without regard to meal.

The recommended dosage of Euphorbia prostrata extract tablet is as follows:
Treatment of hemorrhoids: One 100 mg tablet once daily for 14 days. Post-hemorrhoidectomy setting in patients of grade 3 and 4 hemorrhoids: One 100 mg tablet twice daily for 14 days.

Overdose:

No case of overdose with euphorbia prostrata has been reported till date however in case of overdose general supportive care should be instituted

Packaging:

A carton box contains 3 pvdc/alu blisters, each contains 10 film coated tablets.

Storage:

Store below 25 °C, protect from light and moisture, keep out of reach of children

THIS IS A MEDICAMENT	
	02:2023
-A medicament is a product but unlike any other products. -A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. -Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks. -Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. -Do not repeat the same prescription without consulting your physician.	
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN	
(Council of Arab Health Ministers)	(Arab Pharmacists Association)



f @ /Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

Ugarit Pharmaceutical Co, Aleppo - syria

