



غو سي بلس

كبسول

متمم غذائي

التداخلات الدوائية:

– ينبغي أخذ الحيطه عند مشاركة متممات الزنك مع المضادات الحيوية الكينولونية لذلك ينبغي ترك فاصل ساعة على الأقل بعد تناول المضادات الحيوية الكينولونية.

– قد يربط الزنك مع المضادات الحيوية التتراسيكلينية في المعدة مما يقلل الامتصاص لذلك ينبغي ترك ساعتين قبل أو أربع ساعات بعد تناول المضادات الحيوية التتراسيكلينية.

– قد يزيد الفيتامين سي من كمية الألمنيوم (الموجودة عادة في أغلب مضادات الحموضة) التي يمتصها الجسم لذا ينبغي أخذه قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول مضادات الحموضة

– قد يزيد الفيتامين سي من التأثيرات والتأثيرات الجانبية للاستروجينات

– قد يقلل الفيتامين سي من فعالية الغلوفينارين
– قد يقلل الفيتامين سي من فعالية الوارفارين وبالتالي يزيد خطر التجلط.

الاستخدام:

عند البالغين ١٨ سنة فما فوق: كبسولة يومياً مع الطعام أو حسب إرشادات الطبيب. تناوله قبل أو بعد ساعات قليلة من تناول الادوية الأخرى.

الحفظ:

يحفظ دون درجة ٢٥ مئوية، في مكان جاف، بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال.

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي على ثلاث صفائح PVC/ALU تحوي كل صفيحة على ١٠ كبسولات.

التركيب:

كل كبسولة تحتوي على: زنك (سيترات) ٥٠ ملغ، فيتامين C ٤٠٠ ملغ.

الخواص:

يؤمّن **غو سي بلس** بتركيبته الحاوية على الزنك وفيتامين C دعم الجهاز المناعي والحفاظ على الوظيفة المناعية السليمة يعتبر **الزنك والفيتامين سي** ضروريان ومساعدان في الحالات التالية:

١- حماية جهاز المناعة

٢- التخلص من الجذور الحرة الضارة

٣- يساهمان في تشكيل الانسجة الضامة، زيادة قوة الجلد ومرورته، تسريع التام الجروح مما يحافظ على صحة الجلد

تنبيهات:

– كما هو الحال مع المتممات الغذائية الأخرى ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي متمم إذا كنت تحت إشراف طبي، الحوامل، المرضعات، الذين يعانون من الحساسيات الغذائية، أو لديهم تحسس نحو أي من المكونات.

– استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك حالة طبية محددة، أو إن كنت تتناول أدوية أخرى.

– ليس المقصود من المتممات الغذائية علاج أو منع أي مرض، كما يجب أن لا تحل محل نظام غذائي متوازن ومتنوع، أو اتباع نظام صحي.

موانع الاستعمال:

التحسس لأي من مكونات المستحضر.

التأثيرات غير المرغوبة:

تناول **غو سي بلس** على معدة فارغة قد يسبب اضطرابات هضمية عند بعض الناس.

احفظ هذا المستحضر وجميع المستحضرات الأخرى بعيداً عن متناول الأطفال.



f @ /Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



أوغاريت للصناعات الدوائية حلب - سوريا



Food supplement

Composition:

Each capsule contains:

Zinc (citrate) 50mg, vitamin c 400mg.

Properties:

Go C Plus provides support for the immune system and maintaining the healthy immune function through its formula of zinc and vitamin C.

Zinc & Vitamin C are necessary and help in the following conditions:

- 1- The Protection of the immune system.
- 2- The elimination of harmful free radicals.
- 3- Contribute information of connecting tissues, accelerate wound healing, and increase strength & flexibility of the skin, therefore they help in maintaining the healthy skin balance.

Precautions:

As with other food supplements seek professional advice before consuming if you are under medical supervision, pregnant, breast-feeding, suffer from food allergies, or are allergic to any of the ingredients.

Consult your doctor or pharmacist if you have an underlying medical condition, or if on medication.

Vitamin supplements are not intended to treat or prevent any disease. Food supplements must not replace a balanced and varied diet, and a healthy lifestyle.

Not to be used:

In case of hypersensitivity to any of the ingredients.

Side effects:

Taking **Go C Plus** on an empty stomach

may cause stomach upset in some people

Drug Interactions:

- Care should be taken when zinc supplements are taking with quinolone antibiotics. At least one hour interval should be left after taking quinolone antibiotics.
- Zinc may be linked with tetracycline antibiotics in the stomach, which reduces absorption. It should left two hours before or four hours after taking tetracycline antibiotics.
- Vitamin C may increase the amount of aluminum (usually present in most antacids) absorbed by the body so it should be taken two hours or four hours after taking antacids
- Vitamin C may increase the effects and side effects of estrogens
- Vitamin C may reduce the effectiveness of fluphenazine
- Vitamin C may reduce the effectiveness of warfarin and thus increase the risk of clotting.

Dosage:

Adults 18 and over: take one capsule per day with food, or as directed by a healthcare practitioner. Take a few hours before or after taking other medications.

Storage:

Store below 25°C in a dry place, out of sight and reach of children.

Presentation:

A carton box contains 3 PVC/Alu blister strips, each containing 10 capsules.

KEEP THIS AND ALL PRODUCTS OUT OF CHILDREN'S REACH!



/Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



Ugarit Pharmaceutical Co., Aleppo- Syria

