

## فينيل ايفرين هيدروكلورايد + تريبروليدين هيدروكلورايد شرب ١٠ + ٢٠/٥ مل مغ

التريكيب:

يحتوي كل ٥ مل من الشرب على:

فينيل ايفرين هيدروكلورايد ١٠ ملغ

تريبروليدين ٢,٥ ملغ

والسواغات: حمض الليمون ، غليسرين ، بروبيلين غليكول ، سيترات الصوديوم ، سكارين الصوديوم ، سوربيتول، منكه العنب ، بنزوات الصوديوم

الاستطبابات:

يخفف مؤقتاً الأعراض الناتجة عن نزلات البرد، حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) أو غيرها من حساسية الجهاز التنفسي العلوي:

- سيلان الأنف.

- العطاس.

- حكة الأنف أو الحلق.

- العين الدامعة، حكة.

- احقان الأنف.

- يقلل من تورم القنوات الأنفية.

التحذيرات:

لا تزيد الجرعة الموصوفة.

لا تستخدم هذا الدواء:

إذا كنت تتناول مثبطات مونوامين أو أكسيداز (MAOI) (بعض أدوية الاكتئاب والحالات النفسية أو العاطفية، أو مرض باركنسون)، أو ليعد أسبوعين من التوقف عن تناول أدوية (MAOI). إذا كنت لا تعرف ما إذا كانت أدويةك تحتوي على (MAOI)، اسأل الطبيب إذا الصيدي قبل أخذ الدواء.

اسأل الطبيب قبل الاستعمال إذا كان لديك:

- مشاكل في التنفس مثل انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

- أمراض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- مرض الغدة الدرقية.

- داء السكري.

- زرق (ارتفاع ضغط العين).

- مشاكل في التبول بسبب تضخم غدة البروستات.

أسأل الطبيب قبل الاستعمال إذا كنت تتناول مسكنات أو مهدئات.

عندما يستخدم هذا الدواء:

- قد يحدث احتياج، وخاصة عند الأطفال.

- قد يسبب النعاس.

- قد يزيد الكحول، المسكنات والمهدئات من تأثير النعاس.

- تجنب المشروبات الكحولية.

- توخي الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

إيقاف الدواء و استشارة الطبيب إذا:

- حدث اضطراب، دوام، أو أرق.

- استمر السعال أو احقان الأنف لأكثر من ١ أسبوع، يميل إلى التكرار أو يرافقه حمى، طفح جلدي أو صداع مستمر. يمكن أن تكون هذه علامات على حالة خطيرة.



- حدوث أعراض جديدة.

- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، استشري اختصاصي الصحة قبل الاستعمال.

- في حالة فرط الجرعة، احصل على المساعدة الطبية أو اتصل بالمركز الطبي حالاً.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

لا تزيد مدة العلاج عن ٥ أيام.

١- الشرب:

العمر	الجرعة
البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة من العمر	١ ملعقة صغيرة (٥ مل) كل ٤ ساعات، لا تزيد عن ٤ ملاعق (٢٠ مل) خلال ٢٤ ساعة، أو حسب توجيهات الطبيب.
الأطفال من ٦ حتى أقل من ١٢ سنة	١/٢ ملعقة صغيرة (٢,٥ مل) كل ٤ ساعات، لا تزيد عن ٢ ملعقة صغيرة (١٠ مل) خلال ٢٤ ساعة، أو حسب توجيهات الطبيب.
الأطفال تحت ٦ سنوات من العمر	مضاد استطباب

٢- الأقراص:

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة من العمر: قرص كل ٤ ساعات، لا تزيد عن ٤ جرعات في ٢٤ ساعة، أو حسب توجيهات الطبيب.

شروط الحفظ:

تحفظ العبوة في درجة حرارة بين ١٥ و ٣٠ درجة مئوية

التعبئة: عبوة زجاجية تحتوي على ١٠٠ مل من شراب زيروفلو .

احفظ هذا الدواء وجميع الأدوية الأخرى بعيداً عن متناول الأطفال.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

(التحد الصيدلانية العرب)

(محش وزراء الصحة العرب)



# ZERO FLU

## Phenylephrine HCl + Triprolidine HCl Syrup 10 + 2.5 mg /5 ml

### Composition:

Each 5 ml of syrup contains:

Phenylephrine Hydrochloride 10 mg  
Triprolidine Hydrochloride 2.5 mg

**and excipients:** Citric acid, Glycerin, Propylene glycol, sodium Citrate, Saccharin sodium Sorbitol, Grape flavor, Sodium benzoate

### Uses:

Temporarily relieves these symptoms due to common cold, hay fever (allergic rhinitis) or other upper Respiratory allergies:

- Runny nose.
- Sneezing.
- Itching of the nose or throat.
- Itchy, watery eyes.
- Nasal congestion.
- Reduces swelling of nasal passages.

### Warnings:

Do not exceed recommended dosage.

### Do not use this product

- If you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before giving this product.

### Ask a doctor before use if you have:

- a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis.
- heart disease.
- high blood pressure.
- thyroid disease.
- Diabetes.
- Glaucoma.
- trouble urinating due to an enlarged prostate gland.

### Ask a doctor before use if you are taking sedatives or tranquilizers.

### When using this product

- excitability may occur, especially in children.
- may cause drowsiness.
- alcohol, sedatives and tranquilizers may increase the drowsiness effect.
- avoid alcoholic beverages.
- use caution when driving a motor vehicle or operating machinery.

### Stop use and ask a doctor if

- nervousness, dizziness, or sleeplessness occur.
- cough or nasal congestion persists for more than 1 week, tends to recur or is accompanied by a fever, rash or persistent headache. These could be signs of a serious condition.
- new symptoms occur.



If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

### Dosage and administration:

Do not exceed 5 days of treatment.

#### 1- Syrup:

AGE	DOSE
Adults and children 12 years of age and older	1 teaspoonful (5 ml) every 4 hours, not to exceed 4 teaspoonfuls (20 ml) in 24 hours, or as directed by a doctor
children 6 to under 12 years of age	½ teaspoonful (2.5 ml) every 4 hours, not to exceed 2 teaspoonfuls (10 ml) in 24 hours, or as directed by a doctor
children under 6 years of age	Contraindicated

#### 2- Tablets:

**Adults and Children 12 years of age and older:** 1 tablet every 4 hours, not to exceed 4 dosages in 24 hours, or as directed by a doctor

**Storage conditions:** To be stored in a temperature between 15 ° C and 30 ° C.

**Packaging:** Glass Bottle Contains 100 ml Syrup of Zero Flu.

#### THIS IS A MEDICATION

- A medication is a product but unlike any other products.
- A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to institutions is dangerous for you.
- Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

**KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN**

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



UGARIT PHARMACEUTICAL Co., Aleppo - Syria

