

PANVENO

Rectal cream



Composition:

Each 1g of cream contains: Euphorbia prostrata dry Extract 10mg (1%) (containing 0.315-0.825mg total flavonoid calculated as apigenin-7-glucoside, 1.26-4.4mg total phenolics calculated as gallic acid)

Mechanism of action:

Flavonoids and phenolic acid have been reported to have anti-inflammatory, analgesic, antioxidant, haemostatic, antithrombotic and vasoprotective actions. Tannins are known to possess astringent and haemostatic properties. Preclinical studies carried out on the extract have confirmed its wound healing and antihemorrhoidal activity.

Indications:

Euphorbia prostrata extract cream is indicated for treatment of grade 1 and 2 internal hemorrhoids

Contraindications:

- History of hypersensitivity to Euphorbia prostrata extract, flavonoids and/or any constituents of the formulation
- Bleeding disorders
- Pregnant or lactating women

Warning And Precautions:

Efficacy and safety of Euphorbia prostrata extract has not been evaluated in pediatric patients. The use of Euphorbia prostrata extract should therefore be avoided in pediatric patients.

Euphorbia prostrata extract cream has not been evaluated in patients with evidence of hepatic and/or renal dysfunction, Therefore it should be avoided in such patients.

Pregnancy and lactation:

Not for Pregnant or lactating women

Drug interactions:

No significant drug interactions have been reported with the use of Euphorbia prostrata extract tablet.

Adverse effects:

Euphorbia prostrata extract cream is generally well tolerated. No serious or severe adverse event has been reported.

Dosage And Administration:

To be applied locally at least twice daily and after each act of defecation for 14 days.

Overdose:

No case of overdose with euphorbia prostrata tablet or cream has been reported till date however in case of overdose general supportive care should be instituted

Packaging:

A carton box contains a tube of Aluminum with a white plastic screw containing 30 g

Storage:

Store below 25 °C, protect from light and moisture, keep out of reach of children

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product but unlike any other products.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)

Ugarit Pharmaceutical Co.
(Fanari & Partners), Aleppo - Syria



/Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com





بانقينو

كريم شرعي

التركيب:

يحتوي كل ١ غ من الكريم على : الخلاصة الجافة لإيفوربيا بروستراتا ١٠ ملغ (١%) (الحاوية على ٣١٥, ٨٢٥٠, ٠ من الفلافونويدات الكلية المحسوبة على أساس أبيجينين-٧-غلوكونيداز، و ٢٦, ٤-١, ٤ ملغ من الفينولات الكلية المحسوبة على أساس غالليك أسيد).

آلية التأثير:

الفلافونويدات وحـمض الفينوليك لهما تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للألم ومضادة للأكسدة ومضادة للتخثر وواقية للأوعية. من المعروف أن التانينات تمتلك خصائص قابضة وخواص تخثر الدم. أكدت الدراسات قبل السريرية التي أجريت على المستخلص قدرته على التئام الجروح وفعاليته المضادة للبواسير.

الاستطبابات:

يستخدم كريم إيفوريا بروستراتا لعلاج البواسير الداخلية من الدرجة الأولى والثانية.

مضادات الاستطباب:

- تاريخ من الحساسية تجاه الإيفوربيا او الفلافونويدات أو أي من المكونات الموجودة في الصيغة.

- اضطرابات النزيف.

- النساء الحوامل أو المرضعات.

التحذيرات والاحتياطات:

- الخلل الوظيفي الكبدي والكلي:

- لم يتم تقييم فعالية وسلامة الخلاصة لدى المرضى الأطفال لذلك يجب تجنب إعطائه للأطفال.

لم يتم تقييم كريم خلاصة Euphorbia prostrata لدى المرضى الذين لديهم دليل على وجود خلل في وظائف الكبد و / أو الكلى لذلك يجب تجنبه في مثل هؤلاء المرضى.

الحمل والإرضاع:

لا يعطي للحوامل والرضعات .

التداخلات الدوائية:

لم يتم الإبلاغ عن أي تداخلات دوائية مهمة.

التأثيرات الغير مرغوبة :

كريم خلاصة إيفوريا بروستراتا عادة ما يكون جيد التحمل. لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة أو شديدة حتى الآن.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

يطبق الكريم موضعياً مرتين على الأقل يوميا وبعد كل تغوط

لمدة ١٤ يوما

فرط الجرعة:

لا يوجد حالات من حدوث فرط جرعة مع استخدام كريم إيفوريا بروستراتا تم الإبلاغ عنها إلى اليوم ولكن في حال حدوث فرط الجرعة يجب أن تؤخذ الرعاية الداعمة العامة في حال فرط الجرعة .

التعنية:

عبوة من الكرتون تحوي عبوة من الألمنيوم ذات غطاء لولبي أبيض من البلاستيك تحتوي على ٣٠ غ.

شروط الحفظ:

يحفظ المستحضر دون الدرجة ٢٥ مئوية بعيدا عن الضوء والرطوبة بعيدا عن متناول الأطفال.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر بوتر على مستحضر واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضروره .
- لا تعط مدّة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الحقوية أبدا في متناول أيدي الأطفال

(مصاد الصيدلة العرب)

(مصاد وزارة الصحة العرب)

شركة أوغاريت للصناعات الدوائية
فكري وشركاه، حلب - سورية

Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

