

ليفا تريت

شراب - مضغوطات

التركيب:

- شراب:

كل ٥ مل من الشراب يحتوي على: خلاصة القبار ٦٨ ملغ، خلاصة الهندباء البرية ٦٨ ملغ، خلاصة المغذ الاسود ٣٢ ملغ، خلاصة الترميزلا ٣٢ ملغ، خلاصة كاسيا اوكسيدنتاليس ١٦ ملغ، خلاصة القيصوم ١٦ ملغ، خلاصة العبل الشجيري ١٦ ملغ.

- مضغوطات:

كل مضغوظة تحتوي على: المساحيق القبار ١٣٠ ملغ، الهندباء البرية ١٣٠ ملغ، اوكسيد الحديد ٦٦ ملغ، المغذ الاسود ٣٢ ملغ، الخلاصات: الترميزلا ٣٢ ملغ، كاسيا اوكسيدنتاليس ١٦ ملغ، القيصوم ١٦ ملغ، العبل الشجيري ١٦ ملغ.

آلية التأثير:

يعيد الكفاءة الوظيفية للكبد عن طريق حماية النسيج البرانشيمي الكبدى وتحفيز تجديد الخلايا الكبدية. يمنع التأثير المضاد للاكسدة للمستحضر فقدان الكفاءة الوظيفية لعضاء الخلية، يحافظ على أنزيمات السيستوكروم، ويسرع فترة الشفاء و يضمن الاستعادة المبكرة لوظائف الكبد في حالة التهاب الكبد المعدى. يسهل المستحضر الإطراح السريع للأسيت الدهيد، المستقلب الوسيط لسمام لاسقلاب الكحول و يعزز الحماية من الأذى الكبدى المحفز بالكحول. يقلل المستحضر من الفعالية الموجهة للشمع في الإدمان الكحولى المزمن. و يمنع ارتشاح الدهون في الكبد. في حالات قبل التليف الكبدى، يوقف المستحضر تقدم المرض و يمنع حدوث المزيد من تلف الكبد، كمتمم غذائى يومى، يحسن الشهية و عمليات الهضم و الامتصاص و يعزز زيادة الوزن.

الاستطبيات:

يستخدم لعلاج و الوقاية من:

- التهاب الكبد الفيروسي.
- مرض كبدى كحولى.
- الحالات السابقة للتليف الكبدى و التليف المبكر.
- سوء التغذية بالبروتين.
- فقدان شهية.
- مرض كبدى ناجم عن العلاج الكيميائى و الشعاعى.

مضادات الاستطباب:

لا يوجد.

التحذيرات:

لا يوجد.

الحمل و الإرضاع:

على الرغم من أن المرأة الحامل و المرضع استخدمت المستحضر لمدة طويلة دون تسجيل أي حالة تشوه خلقى أو تأثيرات جانبية. ينصح باستخدام المستحضر تحت الإشراف الطبى خلال فترة الحمل و الإرضاع.

التداخلات الدوائية:

يقلل المستحضر المستويات الدموية للإيبيروفين مما يسبب تأخر الامتصاص، كما يمكن أن يقلل من التوافر الحيوى للتتراسيكلين و الدوكسيسكلين.

التأثيرات الغير مرغوبة:

لا يوجد.

الجرعة وطريقة إعطاء:

- في تليف الكبد:

قرصين مرتين يومياً أو ٣ مرات يومياً لمدة ٦ إلى ١٢ شهراً

- في التهاب الكبد الفيروسي الحاد:

المضغوطات

- الكبار:

قرصين مرتين يومياً لمدة ٦ أشهر، ثم قرص واحد مرتين في اليوم لمدة ٣-٢ أشهر.

- الشراب:

- الأطفال: ملعقة صغيرة مرتين أو ثلاث مرات يومياً بعد الأكل.

- البالغين: ٢-١ ملعقة صغيرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بعد الوجبات. الحد الأقصى للجرعة اليومية الممكنة هو ٣٠ مل في اليوم. أو حسب توجيهات الطبيب
لمدة تتراوح بين ٣-٢ أشهر بناءً على نصيحة الطبيب.

- في التهاب الكبد المزمن من النشط:

قرصين مرتين يومياً لمدة ٦ أشهر

- في تلف الكبد الناجم عن الكحول:

قرصين مرتين يومياً لمدة شهر واحد، ثم قرص واحد مرتين يومياً.

- مع العلاج المضاد للسل:

٢ قرص مرتين يومياً مع العلاج المضاد للسل.

- في حالات فقدان الشهية وخسارة الوزن:

- البالغون: قرص واحد مرتين يومياً.

كمكمل صحى يومى: مضغوطتان مرتين في اليوم.

التعبية:

عبوة من الكرتون تحتوي على ٣ بلسر PVC/Alu يحتوي كل بلسر على ١٠ مضغوطات.

عبوة من الكرتون تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة ١٠٠ مل أو ٢٠٠ مل بغطاء المنيوم.

شروط الحفظ:

المضغوطات: يحفظ المستحضر عند الدرجة ١٥ - ٣٠ مئوية بعيداً عن الضوء والرطوبة بعيداً عن متناول الأطفال.

- الشراب: يحفظ المستحضر عند الدرجة ١٥ - ٣٠ مئوية بعيداً عن الضوء والرطوبة. بعيداً عن متناول الأطفال و لا يجمد.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كثيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات معرضك للخطر .
- أنت بحاجة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرّفها لك . فاطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالقانون وبقنعه و ضروريه .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد بدهن استشارة الطبيب .

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

(اتصاد الصيدلة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)

شركة أوغاريت للصناعات الدوائية
فدري وشركاه، حلب - سورية



UGARIT

Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



LIVA TREAT

Syrup - Tablet

Composition:

- Syrup:

Each 5ml contains:

Capparis spinosa 68mg, Cichorium intybus 68mg, Solanum nigrum 32mg, Terminalia arjuna 32mg, Cassia occidentalis 16mg, Achillea millefolium 16mg, Tamarix gallica 16mg.

- Tablet:

Each tablet contains:

Capparis spinosa 130 mg, Cichorium intybus 130 mg, Solanum nigrum 64 mg, Cassia occidentalis 32 mg, Terminalia arjuna 64 mg, Achillea millefolium 32 mg, Tamarix gallica 32 mg, Mandur bhasma 66 mg.

Mechanism of action:

It restores the functional efficiency of the liver by protecting the hepatic parenchyma and promoting hepatocellular regeneration. The antiperoxidative activity of The product prevents the loss of functional integrity of the cell membrane, maintains cytochrome p-450, hastens the recovery period and ensures early restoration of hepatic functions in infective hepatitis. The product facilitates rapid elimination of acetaldehyde, the toxic intermediate metabolite of alcohol metabolism, and ensures protection from alcohol-induced hepatic damage. The product diminishes the lipotropic activity in chronic alcoholism, and prevents fatty infiltration of the liver. In pre-cirrhotic conditions, The product arrests the progress of the disease and prevents further liver damage. As a daily health supplement, The product improves appetite, the digestion and assimilation processes and promotes weight gain.

Indications:

It is indicated for prevention and treatment of:

- Viral hepatitis.
- Alcoholic liver disease.
- Pre-cirrhotic conditions and early cirrhosis.
- protein energy malnutrition.
- Loss of appetite.
- Radiation and chemotherapy-induced liver damage.

Contraindications:

None.

Precaution:

None.

Pregnancy and lactation:

although pregnant and lactating women have used The product for a long time without any report cases of teratogenicity or side effects. It is recommended that The product be taken under constant medical supervision during pregnancy and lactation.

Drug interactions:

The product reduces the blood level of ibuprofen, which may possibly suggest delayed absorption. It also reduces the bioavailability of tetracycline and doxycycline.



Adverse effects:

None

Dosage and administration:

- In cirrhosis:

2 tablets b.i.d or t.i.d for 6 to 12 months.

In acute viral hepatitis:

Adults:

2 tablets b.i.d for 6 months, then 1 tablets b.i.d for 2-3 months.

- Syrup:

- Children: 1 tsp twice or thrice a day after meals.

- Adults: 1-2 tsp twice or thrice a day after meals. Maximum possible daily dosage is 30 ml per day. Or as directed by the physician.

- In chronic active hepatitis:

2 tablets b.i.d for 6 months

- In alcohol-induced liver damage:

2 tablets b.i.d for 1 month, then 1 tablet b.i.d.

- With anti-TB treatment:

1-2 tablets b.i.d along with anti-TB treatment.

- In anorexia and weight loss:

- Adults: 1 b.i.d.

As a daily health supplement: 2 tablets b.i.d.

Package:

- Tablets : A carton box contains 3 pvc/alu blister strips, each contains 10 Tab.

- Syrup : a cartoon box contains an amber glass bottle 100 , 200 ml with aluminum cap.

Storage Condition:

- Tablets : Store at 15 - 30 °C. protect from light and moisture. out of the reach of children.

- Syrup : Store at 15 - 30 °C. protect from light and moisture. out of the reach of children don't freeze.

THIS IS A MEDICATION

-A medication is a product but unlike any other products
-A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
-Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
-Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
-Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN

(Council of Arab Health Ministers)

(Arab Pharmacists Association)



Ugarit Pharmaceutical Co.
(Fanari & Partners), Aleppo - Syria

① @ Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

