



ميتادكس

كبسول مديد التحرر ٩٠ ملغ.

التركيب :

كل كبسولة مديدة التحرر تحتوي: (حبيبات مديدة التحرر ملبسة معويا) ٩٠ ملغ من زيت النعناع عالي النقاوة (مايكافي بالمجم ٤١,٥ ملغ منثول).

المواد:

حبيبات مديدة التحرر ملبسة معويا مستوردة جاهزة للتعبئة.

آلية التأثير:

يمتلك هذا الدواء تأثير مضاد للتشنج على العضلات الملساء في الجهاز المعدي المعوي. كما يمتلك تأثير طارد للريح، مدر الصفراء، مضاد للحرارة.

الحركة الدوائية:

يتم امتصاص المنثول بسرعة بعد تناوله عن طريق الفم، ويتم اطلاقه بشكل رئيسي عن طريق الصفراء. تم تحديد المنثول - غلوكورونيد باعتباره المستقبل الرئيسي، بالإضافة إلى مشتقات المنثول أحادية أو ثنائية الهيدروكسيل.

الاستطبابات:

- السعال / التهاب القصبات

- التهاب الفم والبلعوم

- شكاوى الكبد والمرارة

- شكاوى عسر الهضم

- الميل إلى الإصابة بالانتانات

يستخدم الدواء داخليا لتشنجات الجزء العلوي من الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية، القولون العصبي، التهاب الجهاز التنفسي، و التهاب الفم والغشاء المخاطي للبلعوم.

مضادات الاستطباب:

تشمل مضادات الاستطباب للاستخدام الداخلي:

انسداد القنوات الصفراوية، التهاب المرارة، آذيات الكبد الشديدة. يمكن أن يعاني الحاملين لحصوات المرارة من المغص بسبب تأثيره الكولينرجي.

التأثيرات الجانبية:

قد يتسبب زيت النعناع بنفاذات حساسية تتميز بالتهاب الجلد التماسي، حرق جلدي، توهج، تدمع، صدادع وقد يسبب زيادة أعراض حرقة المعدة، وفتق الحجاب الحاجز، وقرحة المعدة.

احتياطات:

العاملة: لا توجد مخاطر صحية معروفة بالتزامن مع الاستخدام السليم للجراحات العلاجية المحددة.

يمكن أن يؤدي تناوله إلى شكاوى معدية عند الأشخاص المعرضين لذلك

يمتلك الزيت العطري احتمالية ضعيفة لحدوث حساسية بسبب محتواه من المنثول.

يجب توخي الحذر عند إعطاء هذا الدواء للمرضى الذين لديهم الميل لحدوث القلس المعدي المريئي.

التداخلات الدوائية :

- قد ينشط زيت النعناع أنزيم سينتروكوم 3A4 (CYP-450) P450، يستخدم بحذر مع الأدوية التي تستقلب بهذا الأنزيم.

الحمل والإرضاع :

تم توثيق ردود الفعل السلبية، خاصة مع الجرعات الكبيرة، باستخدام النعناع. يجب تجنب استخدامه في الحمل بسبب تأثيراته المطمئة. يقال إن النعناع من أكثر الأدوية العشبية شيوعا التي تستخدمها النساء في البلدان الآسيوية، وفي جرعات منخفضة، يُعتبر آمنا أثناء الحمل، مع عدم وجود آثار ضارة على الأم أو الجنين. ومع ذلك، فإن تناول جرعات عالية يمكن أن يؤدي إلى الحيز والإجهاض.

الجرعة وطريقة الإعطاء :

الجرعة الموصى بها حتى ١٢٠٠ ملغ / يوميا من زيت النعناع الملبس معويا.

من أجل الكبسول الحاوي على زيت النعناع بتركيز ٩٠٠ ملغ :

في الحالات الشديدة: يعطى كبسولتان ثلاث مرات في اليوم (لمدة أربعة أسابيع).

الوقاية اليومية للصحة الهضمية: يعطى كبسولتان مرة واحدة يوميا.

يجب أن تتناول الكبسولات قبل الوجبات ب ٣٠ - ٩٠ دقيقة.

فرط الجرعة :

لم يتم تسجيل حالات تسمم.

الجرعة الدنيا المميّنة من المنثول تقدر ب ٢ غ

بالرغم من أنه قد نجا الأفراد بجرعات أعلى (٨ إلى ٩ غ).

شروط الحفظ:

يحفظ المستحضر دون درجة ٣٠ مئوية. بعيدا عن متناول الأطفال.

التعبئة:

عبوة من الكرتون تحوي صفحاة او ثلاث صفائح pvc/alu تحتوي كل صفحاة على ١٠ كبسولات مديدة التحرر.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فاطبيبك والصيدلاني هما الغيران بالواء ونقعه وضربه .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال

(الصحة الصيدلانية المغرب)

(مجلس وزراء الصحة المغرب)



شركة أوجاريت للصناعات الدوائية
فنري وشركاه - حلب سورية

Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com



MINTADEX

Sustained release capsules 90mg

COMPOSITION:

Each Sustained release Capsule Contains Sustained release enteric coated pellets: 90 mg Ultra-Purified Peppermint Oil (Total L-Menthol: 41.5 mg).

EXCIPIENTS:

Imported ready to fill Sustained release enteric coated pellets.

Pharmacodynamics:

The drug has a spasmolytic effect on smooth muscle of the gastrointestinal tract. It is a carminative, cholagogue, antibacterial.

Pharmacokinetics:

Absorption of menthol is rapid following oral administration, and elimination is mainly via bile.

Menthol-glucuronide has been identified as the main metabolite, in addition to mono- or dihydroxylated menthol derivatives

Indications :

- Inflammation of the mouth and pharynx.
- Liver and gallbladder complaints.
- Dyspeptic complaints.
- Tendency to infection.

The drug is used internally for cramps of the upper gastrointestinal tract and bile ducts, irritable colon, catarrhs of the respiratory tract, and inflammation of the oral and pharyngeal mucosa.

Contraindications:

Contraindications for the internal administration of the drug Include:
Occlusion of the biliary ducts, gallbladder inflammation and severe liver damage.
Gallstone carriers could experience colic due to the cholagogic effect.

Adverse Effects:

Peppermint oil may cause allergic reactions characterized by contact dermatitis, cutaneous burning, flushing, lacrimation, and headache, and may cause worsen the symptoms of heartburn, hiatus hernias, and stomach ulcers.

Precautions:

General: No health hazards are known in conjunction with the proper administration of designated therapeutic dosages.

The intake can lead to gastric complaints in susceptible persons.

The volatile oil possesses a weak potential for sensitization due to its menthol content.

One is advised against administration of the drug in the presence of a tendency to gastro esophageal reflux.



Interactions:

- Peppermint oil may inhibit cytochrome P450 (CYP-450) 3A4; use caution when administering with drugs metabolized by this enzyme

Pregnancy/Lactation:

Adverse reactions, particularly with higher doses, have been documented with use of peppermint. Use in pregnancy should be avoided because of emmenagogue effects. Peppermint is reported to be one of the most commonly used herbal medicines by women in Asian countries and, in low doses, is considered safe during pregnancy, with no harmful effects observed to mother or fetus. However, consumption of high doses can trigger menstruation and abortion.

Dosage and Administration:

Dosages of up to 1,200 mg/day of enteric-coated peppermint oil.

For capsules containing 90 mg peppermint oil:

When in Flare : Two capsules, three times a day, for four weeks.

Daily and Proactive Gut-Health Support :

Two capsules once a day.

Take 30 to 90 minutes before a meal, with water

Overdosage :

Cases of poisoning are not recorded. The minimal lethal dosage of menthol is estimated to be 2 gm, although individuals have survived higher dosages (8 to 9 gm).

STORAGE CONDITIONS:

Store below 30 °C. Out of reach of children.

PACKAGING:

A carton box containing one or three PVC/Alu blister strips, each contains 10 sustained release capsules.

THIS IS A MEDICAMENT	
-A medicament is a product but unlike any other products. -A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. -Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks. -Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. -Do not repeat the same prescription without consulting your physician.	
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN	
(Council of Arab Health Ministers)	(Arab Pharmacists Association)



Ugarit pharmaceutical Co.
Fanari & Partners - Aleppo, Syria
f @ Ugaritpharma
www.ugaritpharma.com

